

.Net
La faculté
Seek Knowledge





Cas clinique pneumonie

Un homme de 40 ans, tabagique, sans antécédents pathologiques, qui consulte pour une symptomatologie faite d'une toux ,expectoration et dyspnée ,d'où son hospitalisation. Le début remonte à 4 jours, marqué par une fièvre à 40°, une douleur hémi thoracique droite, une toux sèche et une diarrhée. Le patient a déjà reçu durant trois jours de l'amoxicilline:3g/j. L'examen clinique montre un patient dont l'état général moyen, confus, fébrile à 39°C, FC = 100b/mn, FR = 24c/mn, TA = 100/70mmHg avec un syndrome de condensation de la moitié supérieure de l'hémi thorax droit. La radiographie thoracique de face montre une opacité dense, homogène, mal limitée de la moitié supérieure de l'hémi thorax droit.

1/ -- tous ces éléments vous orientent vers le diagnostic sauf un, lequel ?

A- L'image radiographique
B- La confusion **NAP = 1**
C- La diarrhée
D- L'inefficacité de l'amoxicilline
E- L'âge du patient

2- l'agent infectieux suspecté en premier lieu ,est :

A- Pneumocoque
B- Hémophilus influenzae **NAP = 0.33**
C- Mycoplasme pneumonae
D- Légionella pneumophila
E- Staphylocoque doré

3 - quelle sera votre conduite thérapeutique ?

A- Amoxicilline + acide clavulanique
B- Tétracycline
C- Erythromycine **NAP = 1**
D- Pénicilline
E- Oxacilline + Gentamycine

3/ - le diagnostic de certitude sera fait par l'examen suivant : **NAP = 1**

1- examen bactériologique de l'expectoration
2- recherche d'antigènes solubles dans les urines, d'anticorps dans le sang
3- examen bactériologie du liquide d'aspiration par ponction transtrachéale
4- recherche de germes par coproculture
5- sérologie à légionelle

Réponse : **A =2+5** B= 2+4 C= 1+5 D = 3+4 E = 1+3